

LABEL

Sprayfo OsmoFit

Aanvullend dieetvoer voor kalveren voor de stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering

Samenstelling: Lactose, Kaliumchloride, Natriumchloride, Rodebietensap (poeder).

Analytische bestanddelen en gehalten: Ruw eiwit 7,0%, Ruwe vezel 0,0%, Ruw vet 0,0%, Ruwe as 14,0%, Natrium 6,0%, Kalium 3,5%, Chloride 3,8%.

Toevoegingsmiddelen per kg: Verbindingen van spoorelementen: Zink – Zn, zink chelaat van eiwithydrolysaat (3b612) 331 mg.

Gebruiksaanwijzing: Gebruik Sprayfo OsmoFit in geval van risico van spijsverteringsstoornissen (diarree) bij kalveren tot een leeftijd van 6 maanden.

Aanbevolen gebruik: 1 tot 7 dagen.

Toepassing: Doseer 60 gram in 2 liter lauwwarm water (25 0 – 35 0 C) en verstrek dit tweemaal per dag tussen de melk(vervanger)voedingen door totdat de diarree is gestopt.

Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen.

Niet mengen met melk(vervanger).

Bij het verstrekken van een elektrolytenoplossing is het sterk aanbevolen op kalveren te allen tijde toegang te geven tot drinkwater.

Koel, donker en droog bewaren in gesloten verpakking.

Label

Sprayfo OsmoFit

Dietetic complementary feed for calves to stabilise the water and electrolyte balance to support the physiological digestion

Composition: Lactose, Potassium chloride, Sodium chloride, Beetroot juice powder.

Analytical constituents: Crude protein 7,0%, Crude fibre 0,0%, Crude fats 0,0%, Crude ash 14,0%, Sodium 6,0%, Potassium 3,5%, Chloride 3,8%

Additives per kg: Compounds of trace elements: Zinc – Zn, Zinc chelate of protein hydrolysate (3b612) 331 mg.

Directions for use: Use Sprayfo OsmoFit in case of risk of, during periods of, or recovery from digestive disturbance (diarrhoea) in calves up to an age of 6 months.

Recommended length of use: up to 7 days.

Advised application: add 60 grams to two liters of lukewarm water (25-35°C) and provide between feedings (calf milk replacer or whole milk). Provide two liters twice daily until resolution of digestive disturbance (diarrhoea).

It is recommended that a veterinarian's opinion be sought before use.

Do not mix with whole milk or calf milk replacer.

It is highly recommended to always have access to fresh drinking water when providing electrolytes.

Store in a cool, dark and dry place in sealed packaging.